

## Антиацидозный премикс ПКК 60-1 (СМ-КРС1 буф)

*Вынужденное использование в кормлении КРС силосованных кормов, с повышенным содержанием органических кислот, скармливание большого количества (значительно выше нормы) быстро ферментируемых концентрированных кормов на фоне пониженного уровня клетчатки в рационе с целью поддержания упитанности коров в первую фазу лактации, как и некоторые прочие нарушения структуры рационов, технологии кормления коров, вызывают снижение рН в рубце и приводит к развитию субклинической и клинической форм ацидоза.*

### **Внешними признаками ацидоза являются:**

- снижение потребления сухого вещества рациона;
- животные не интересуются свежим кормом;
- меньше 50% животных жуют жвачку;
- варьирует цвет и консистенция кала;
- снижение содержания жира в молоке;
- коровы вялые, истощены, шерсть взъерошена;
- большинство коров сортируют кормосмесь;
- кормовой стол с плешинами и буграми кормов;
- велики остатки кормов;
- хромота.

Для предотвращения закисления рубца, развития ацидоза применяется смесь **ПКК 60-1 (СМ-КРС1 буф)** для раскисления силосов, снижения кислотности рубца и повышения резервной щелочности крови. Это способствует профилактике и лечению ацидозов у высокопродуктивных коров, повышению потребления и переваримости питательных веществ корма, увеличению удоев и жирности молока.

Продукцию от животных после применения премикса можно использовать в пищевых целях без ограничений. Норма скармливания премикса составляет **4-5 г на 1 кг потребляемого силоса**. Смесь не рекомендуется давать коровам за 2-3 недели до отелов. Новотельным коровам рекомендуется скармливать премикс вволю. Продукцию от животных после применения премикса можно использовать в пищевых целях без ограничений.