

Премиксы с антистрессовыми и гепатопротекторными свойствами

Премикс **ПКК 60-3стресс** обладает иммуностимулирующими, антиоксидантными и гепатопротекторными свойствами. Премикс применяется для профилактики отрицательного воздействия стресс-факторов различной природы на организм КРС (температура окружающей среды свыше 22 °С, вакцинация, транспортировка, перегруппировка стада, резкая смена рационов и т.д.). Зона комфортных температур для крупного рогатого скота располагается между 5 и 20 °С. При более высоких температурах развивается тепловой стресс. Суммарные потери от его воздействия на организм молочной коровы оцениваются в 17-20 тыс. рублей в год на 1 голову. Премикс нейтрализует проявление стадного испуга и подавляет агрессию. Скармливание премикса нормализует рубцовое пищеварение, повышает потребление корма и эффективность его использования на 7-10%, снижает риск возникновения ацидозов и кетозов, увеличивает рентабельность отрасли. **ПКК 60-3стресс** дают ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета **10 г/кг сухого вещества корма за неделю до воздействия стрессового фактора, в период его действия и в течение 2-3 недель после его окончания.**

Премикс **ПКК 60-3гепато** обладает гепатопротекторными и антиоксидантными свойствами. Премикс используется для профилактики и лечения жировой дистрофии печени. Уникальный пробиотик в сочетании с ниацином нормализует рубцовое пищеварение, повышает переваримость клетчатки и поедаемость объемистых кормов, снижает уровень заболеваемости кетозом. Премикс улучшает использование энергии в организме животных. Входящие в его состав источники энергии подобраны по скорости ферментации в рубце (энергетическая эстафета), что обеспечивает равномерное и длительное поступление энергии в организм. **ПКК 60-3гепато** используют с основным рационом. Его дают ежедневно в дозе **8-10 г/кг сухого вещества** рациона в течение 2-3 недель до отела и 4-6 недель после отелов (дневную норму рекомендуется разделить на две дачи).

ПКК 60-3гепато можно успешно использовать в кормление молодняка КРС на откорме в дозе **8-10 г/кг сухого вещества рациона в течение 2-3 месяцев.**

Премиксы ПКК 60-3стресс и ПКК 60-3гепато вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию животноводства можно использовать без ограничения.