

## Премиксы, улучшающие качество молока.

Премикс **ПКК 60-3белок** содержит защищенный метионин, специальный пробиотик, оптимальный катионно-анионный комплекс и необходимые витамины группы В. Применение данной рецептуры премикса в кормлении лактирующих коров способствует повышению концентрации белка в молоке на 0,2-0,4 абс.%, улучшению технологических свойств молока (выход сыра увеличивается на 6-9%), предупреждению перерождения печени, и улучшению воспроизводительной функции. Премикс нормализует рубцовое пищеварение при концентратном типе кормления, повышает переваримость клетчатки и поедаемость объемистых кормов, снижает риск возникновения ацидоза. Затраты на приобретение премикса окупаются до 2 раз. Премикс **ПКК 60-3белок** скармливают ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета **9-10 г/кг сухого вещества корма**, или по **160-220 г/голову/сутки**, в зависимости от продуктивности и живой массы коров.

Премикс **ПКК 60-3жир** содержит защищенный растительный жир, специальный пробиотик, оптимальный минеральный комплекс. При применении премикса в кормлении дойных коров, его компоненты способствуют повышению концентрации жира в молоке на 0,2-0,4 абс.%, улучшению технологических свойств молока и воспроизводительной функции у высокопродуктивных коров. Премикс нормализует рубцовое пищеварение при концентратном типе кормления, повышает переваримость клетчатки и поедаемость объемистых кормов, снижает риск возникновения ацидоза. Премикс также эффективен в переходный и пастбищный периоды содержания коров. Премикс **ПКК 60-3жир** скармливают ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета **9-10 г/кг сухого вещества корма**, или по **160-220 г/голову/сутки** в зависимости от продуктивности и живой массы коров.

Премикс **ПКК 60-3соматика** содержит комплекс витаминов группы В, антиоксидантов, минеральных элементов, иммуномодуляторов. Премикс позволяет укрепить иммунитет, уменьшить число соматических клеток в молоке, снизить затраты на лечение, сократить выбраковку животных. Добавки снижают появление маститов, эндометритов, улучшают воспроизводительную функцию (сервис-период сокращается на 15-30 дней, индекс осеменения снижается в 1,5 раза и др.), увеличивают продуктивное долголетие коров и рентабельность отрасли. Премикс **ПКК 60-3соматика** скармливают коровам ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета **100-200 г/голову/сутки**, в зависимости от количества соматических клеток в течение 2-3 месяцев (до улучшения сортности молока).

**Премиксы ПКК 60-3белок, ПКК 60-3жир, ПКК 60-3соматика вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию животноводства можно использовать без ограничения.**