

## Для профилактики и лечения заболеваний копыт у крупного рогатого скота (ПКК 60-Зкопытце)

*Заболевания копыт в животноводстве причиняют значительный ущерб, связанный, в первую очередь, с потерей продуктивности, расходами на лечение и причинением необратимого вреда здоровью коров. Причиной может быть нарушение зоогигиенических нормативов содержания животных: твёрдые полы, недостаток мест для отдыха, непродуманное размещение поилок, вследствие чего животные вынуждены больше стоять или ходить.*

При значительном поражении животных в стаде (более 5 % поголовья) следует обращать внимание не только на условия содержания животных, но и на кормление. Зачастую заболевания копыт являются следствием лактатного ацидоза.

Образовавшиеся при ацидозе рубцового содержимого патогенные продукты, попадая в кровь, вызывают нарушение местного кровообращения в подроговом слое копытца. В дерме развивается кислородная недостаточность, она опухает. Вследствие нарушения порозности сосудов возникают небольшие кровотечения. Повреждение дермы приводит к ослаблению крепления рогового башмака копытца. Роговая ткань деформируется, в стенке копыта возникают пустоты. Создаются условия для проникновения грязи и бактерий внутрь копыта. Далее происходят необратимые разрушения копытной кости. Даже после излечения такие копытца остаются восприимчивыми к повреждению роговой ткани.

Необходимо постоянно контролировать состояние копытца у коров. При выявлении патологии следует установить её причины.

Премикс **ПКК 60-Зкопытце** применяется для улучшения состояния копытца у КРС. Высокое содержание органического цинка, биотина и серы в премиксе способствует нормальному процессу кератинизации, позволяя уменьшить число заболеваний копытца. Кроме того, данная добавка способствует кератинизации молочного канала сосков вымени у коров при запуске, профилактируя заболевания маститом. Компоненты премикса нормализуют рубцовое пищеварение, повышают переваримость клетчатки, снижают риск возникновения ацидозов и кетозов, увеличивают продуктивное долголетие коров и тем самым рентабельность скотоводства.

Премикс **ПКК 60-Зкопытце** скармливают ежедневно дополнительно к основному рациону, содержащему базовый премикс, из расчета **4-6 г/кг сухого вещества корма, или по 50-100 г/голову/сутки** в зависимости от живой массы и тяжести заболеваний копыт у животных. Продолжительность дачи премикса составляет 2-3 месяца.

**Его вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию животноводства можно использовать без ограничения.**